


Reconnaître et surveiller  
les plantes invasives  
en Bretagne



FREDON Bretagne



*Le Raisin d'Amérique*  
- *Phytolacca americana* -

## Présentation



Le phytolaque (également appelé *Teinturier* ou *Raisin d'Amérique*) est une plante originaire d'Amérique du Nord. Elle fut introduite en France au début du XVI<sup>ème</sup> siècle pour réaliser des teintures et colorer les vins de mauvaise qualité.

Ces pratiques furent vite abandonnées à cause de la toxicité de la plante. Elle a une durée de vie variant de 3 à 10 ans. Sa floraison débute fin juin et se poursuit jusqu'en octobre. Elle pousse dans des secteurs boisés et affectionne les sols riches ou acides. Elle possède des propriétés allélopathiques qui font d'elle une forte compétitrice. Elle est résistante à l'ombre, au froid (jusqu'à -15°C) et présente des tendances pyrophiles (le feu favorise sa régénération).

## Reconnaissance



Taille jusqu'à 3 m  
Tige creuse et rougeâtre

Mr Beiller - DDTM-35



Feuilles à court pétiole  
ovales lancéolées

FREDON Bretagne



Les fleurs en grappe  
dressée blanches ou  
rosâtres à 5 pétales

FREDON Bretagne



Les baies sont en  
grappes penchées  
chacune d'environ 1 cm  
de diamètre, d'abord  
vertes devenant pourpre  
et enfin noir à maturité.

FREDON Bretagne

## Risque



La plante est intégralement toxique. A partir d'une tasse d'infusion des feuilles ou de 10 baies ingérées (pour un adulte) les premiers symptômes apparaissent (diarrhée aiguë, vomissements, douleurs abdominales, tachycardie, vertiges).

Sa toxicité est avérée pour les bovins, les porcs, les chevaux, les moutons, certains mollusques et certaines volailles (dinde notamment). Des cas d'empoisonnement ont été recensés pour des chevaux en forêt de Fontainebleau conduisant à la mort des animaux. Le pâturage est donc à proscrire comme moyen de gestion du phytolaque.



## Lutte



La plante doit être manipulée avec des gants pour limiter les risques d'intoxication.

### ) Petite surface infestée :



#### Arrachage

Méthode à réaliser au plus tard en juin / juillet avant que les plantes ne deviennent trop importantes. En fin d'été les massifs de phytolaque s'avèrent beaucoup plus compliqués d'accès.

Par l'utilisation d'outils tels qu'une pioche, une bêche, il faut sectionner la racine sous le collet. Cela permet d'empêcher la racine d'alimenter le collet. Cette technique s'applique sur des pieds qui mesurent au moins 20 cm. Passer un coup de sarcloir suffira pour les petites plantules (moins de 20 cm).



## ) Grande surface infestée :



### Fauchage

Le fauchage sert à limiter le développement des plants en massif et à épuiser les réserves du végétal. Il se réalise par coup de machette ou de bêche.



**À faire**

**Privilégier les espèces végétales locales**



**À ne pas faire**

**Ne pas semer ou planter**

**Ne pas disséminer**



Fédération Régionale de Défense contre les  
Organismes Nuisibles de Bretagne

ZA Bellevue - 5 rue Antoine de Saint-Exupéry - 35235 THORIGNÉ-FOUILLARD  
Tél. : 02 23 21 18 18 - fredon@fredon-bretagne.com

[WWW.FREDON-BRETAGNE.COM](http://WWW.FREDON-BRETAGNE.COM)

Avec le soutien de :

